


- Primera dosis
- Segunda dosis



DE 7 A 14 DÍAS
 Inicio de la infección

DE 2 A 3 DÍAS
 El sarampión empieza típicamente con una subida de fiebre, tos, moqueo nasal y enrojecimiento de la nariz y ojos acuosos

DE 0 A 2 DÍAS
 Aparecen pequeños puntos blancos (puntos Koplik) aparecen en el interior de la boca

UNOS DÍAS MÁS TARDE
 Comienza la erupción como pequeños puntos planos rojos que aparecen en la cara y se van extendiendo hacia el resto del cuerpo. La fiebre llega a los 40°C

Normalmente, después de unos días la fiebre baja y la erupción se desvanece



EN ALGUNOS CASOS

Encefalitis
 1/1000 personas con sarampión desarrollará encefalitis, que provoca un aumento del cerebro. Puede desencadenar sordera, retraso mental

Infecciones de oído
 1/10 niños desarrollará infecciones auditivas, que pueden terminar en pérdida auditiva

Neumonía
 1/20 pequeños sufrirá complicaciones derivadas de una neumonía, principal causa de muerte por sarampión

Diarrea
 Cerca del 8% de los casos registrados desde 1985 hasta 1992, los pacientes experimentan esta alteración gastrointestinal

Mortalidad
 1-2/1.000 niños que contraen el virus fallecen

NÚMERO DE CASOS DE SARAPIÓN

	2016	2017	
Austria	27	95	▲
Bélgica	80	368	▲
Bulgaria	1	166	▲
Chipre	0	3	▲
R. Checa	7	146	▲
Alemania	323	929	▲
Dinamarca	3	4	▲
Estonia	2	1	▲
Grecia	0	967	▲
ESPAÑA	38	160	▲
Finlandia	4	10	▲
Francia	7	518	▲
Croacia	4	7	▲
Hungría	0	36	▲
Irlanda	44	21	▼
Islandia	1	3	▲
Italia	843	5.004	▲
Lituania	2	2	▬
Luxemb.	6	4	▼
Letonia	0	0	▬
Malta	0	0	▬
P. Bajos	0	16	▲
Noruega	1	1	▬
Polonia	1	62	▲
Portugal	0	34	▲
Rumanía	1.576	5.560	▲
Suecia	3	41	▲
Eslovenia	1	7	▲
Eslovaquia	0	6	▲
R. Unido	571	280	▼

TASA POR MILLÓN DE HABITANTES (2017)

- 0
- 0,01-0,99
- 1,00-9,99
- 10,00-19,99
- >20,00
- No incluidos

TOTAL CASOS UE

